

年 月 日生まれ

くん
ちゃん

予防接種スケジュール(3歳未満)

記入日

◎新しいワクチンが導入されたり、制度が変更されたりすることがあります。具体的な接種スケジュールは、最新のスケジュールをご確認のうえ、かかりつけ医と相談しましょう。

		種類	標準的な 接種時期	0 か 月	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳
				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肺炎球菌 (PCV13、PCV15)		不活化	2, 3, 4か月に各1回 12-15か月に1回																
B型肝炎 (HBV)	ユニバーサル	不活化	2, 3か月に各1回 7-8か月に1回																
	母子感染予防		0, 1, 6か月に各1回	注1) B型肝炎ウイルス抗原陽性のお母さんから生まれたお子さんの場合															
ロタウイルス (経口)	1価ワクチン	経口生	2, 3か月に各1回	注2) 生後6週から接種可能。24週までに2回目を完了															
	5価ワクチン		2, 3, 4か月に各1回	注3) 生後6週から接種可能。32週までに3回目を完了															
5種混合 (DPT-IPV-Hib)		不活化	2, 3, 4か月に各1回 12-18か月に1回																
インフルエンザ菌b型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化	2, 3, 4か月に各1回 12-17か月に1回																
4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化	2, 3, 4か月に各1回 12-18か月に1回																
3種混合 (DPT)		不活化	2, 3, 4か月に各1回 12-18か月に1回																
2種混合 (DT)		不活化	11歳に1回																
ポリオ (IPV)		不活化	2, 3, 4か月に各1回 12-18か月に1回																
BCG		注射生	5-7か月に1回																
				注4) 標準的には生後5〜8か月未満に接種。ただし結核の発生頻度の高い地域では早期からの接種が必要															
麻しん、風しん (MR)		注射生	12-23か月に1回 5-6歳に1回																
水痘		注射生	12-15か月に1回 18-23か月に1回																
おたふくかぜ		注射生	12-15か月に1回 5-6歳に1回																
日本脳炎		不活化	3歳に2回 4歳に1回 9-12歳に1回																
				注5) 流行地域において罹患リスクの高いお子さんには生後6か月からの定期接種を推奨															
インフルエンザ		不活化	毎年10月、11月などに 2回																
				注6) 毎年(10月、11月などに)2回接種															
新型コロナウイルス		mRNA	製剤ごとに定められた 方法により接種する																

●異なるワクチンの接種間隔
注射生ワクチン同士は中27日以上、それ以外のワクチンは制限なし

●不活化ワクチンと経口生ワクチンの違い
不活化ワクチンは細菌・ウイルスを加熱や薬剤などで処理し、毒性や感染力をなくしたもの、または細菌やウイルスの成分(タンパクや遺伝情報など)で作ったワクチンです。経口生ワクチンは生きている細菌・ウイルスの毒性や感染力を弱めて作ったワクチンです。

定期接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

健康保険での接種時期

任意接種の推奨期間

任意接種の接種可能な期間

医療機関名

電話番号

()